



برنامه تغذیه مزارع خربزه و هندوانه

مقدار	روش مصرف	نوع کود مصرفی	زمان مصرف
۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	مخلوط با خاک	فسفات آلی گوگردی	قبل از کشت
۲ لیتر + ۵ لیتر آب	برای ۱۰۰ کیلو بذر	روی مایع	بذر مال
۲ لیتر + ۵ لیتر آب		سیوید	
۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۱۰-۵۲-۱۰	بعد از ۵ برگی شدن
۱۰-۱۵ لیتر در هکتار		اسید هیومیک	
۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۲۰-۲۰-۲۰ فلورامین	قبل از گلدهی
۲ لیتر در هکتار	محلول پاشی	روی بر	ظهور اولین گل‌ها
۱-۲ لیتر در هکتار		سیوید	
۲ لیتر در هکتار	محلول پاشی	آمینومیکرومیکس	بعد از تشکیل اولین میوه‌ها
۲ لیتر در هکتار		نیترات کلسیم	یک هفته بعد
۵ کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی	۱۲-۱۲-۳۷	مرحله گردویی شدن میوه‌ها
۱۵ کیلوگرم در هکتار	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	سولفات پتاسیم	رشد میوه‌ها
۲-۳ لیتر در هکتار	محلول پاشی	سیلیکات پتاسیم	